

Исключения из Программы «Ведение беременности» - показания для направления беременных высокого риска по материнской (материнский риск III) и перинатальной смертности (перинатальный риск III, и материнский II+ перинатальный II) в ГУЗ «Перинатальный центр МЗ ХК».

Факторы риска при беременности и в родах:

- 1) Анамнестические:
 - синдром потериплода (неоднократные репродуктивные потери в анамнезе в сочетании с возрастом более 35 лет - более 3 самопроизвольных выкидышей);
 - случаи перинатальной смертности в анамнезе
 - беременность после длительного (свыше 5 лет) бесплодия в сочетании с первыми родами в возрасте свыше 35 лет;
 - индуцированная беременность или беременность, наступившая с помощью репродуктивных технологий;
 - беременность на фоне АФС;
 - множественная миома матки с размерами узлов более 6 см.
- 2) Акушерские осложнения:
 - рубец на матке после 2 и более операций «кесарево сечение»;
 - любые формы гестоза 3 степени тяжести, преэклампсия, эклампсия, атипичные, осложненные, сочетанные, длительно текущие формы гестоза;
 - декомпенсированная ХФПН (ЗВУР 2-3 степени, гипоксия плода тяжелой степени, нарушения кровотока 3 степени;
 - выраженные нарушения в системе гемостаза, врожденные его дефекты;
 - центральный вариант предлежания плаценты с признаками вращения плаценты;
 - монохориальная двойня, тройня;
 - преждевременные роды с 28 до 34 недель.
- 3) Экстрагенитальная патология:
 - пороки сердца с нарушением кровообращения;
 - холестаза и гепатоз беременных;
 - сахарный диабет;
 - гипертоническая болезнь 2-3 стадии;
 - анемия 2-3 степени;
 - гломерулонефрит, хронический пиелонефрит единственной почки;
 - тромбоцитопении, врожденные и приобретенные дефекты свертывающей системы крови с появлением маркеров внутрисосудистого свертывания;
 - состояние после перенесенного ОНМК, тромбоза;
 - изосенсибилизация по системе АВО и резус-фактору;

- злокачественные новообразования в анамнезе или выявленные во время беременности;

- другие формы экстрагенитальной патологии в стадии декомпенсации с выраженной недостаточностью органов и систем.

4) Сочетания факторов риска:

- анамнестических (возраст старше 35 лет, «синдром потери плода», бесплодие), акушерских (многоплодная беременность, миома матки, рубец на матке после операции кесарево сечение, внутриутробное инфицирование плода, опухолевидные образования яичников) и экстрагенитальных заболеваний (ожирение, хроническая артериальная гипертензия, нарушение функции щитовидной железы, бронхиальная астма с дыхательной недостаточностью, пороки сердца, хронические заболевания почек прогрессирующего течения с почечной недостаточностью).